



## Daten und Fakten zum Klimawandel Niederrheinische Bucht


Die Niederrheinische Bucht wird im Süden von der Eifel und im Osten vom Bergischen Land eingefasst; im Norden geht sie in das Niederrheinische Tiefland über. Entlang des Rheintals werden Höhen zwischen 30 und 50 Meter über Meereshöhe erreicht. Im Süden steigt das Gelände in Richtung Eifel auf bis zu 200 Meter an. In der typischen Bördelandschaft der Kölner Bucht dominiert der Ackerbau, Grünland ist weitgehend auf die Flussauen beschränkt und inzwischen stark zurückgedrängt. Der Anteil der landwirtschaftlichen Flächennutzung entspricht mit 50 Prozent genau dem Mittel für NRW. Wald in nennenswerter Ausdehnung findet sich nur auf der Bergischen Heideterrasse und in Teilen der Ville. So liegt der Waldanteil mit elf Prozent deutlich unter dem Landesschnitt von 26 Prozent. Darüber hinaus wird die Niederrheinische Bucht mit Köln und Teilbereichen Bonns vom zweithöchsten Siedlungsflächenanteil\* im Vergleich zu 17 Prozent im Landeschnitt geprägt.



Typische landwirtschaftliche Nutzung in der Niederrheinischen Bucht (Anstel, Rommerskirchen).

\* Die Siedlungsfläche setzt sich nach dem ATKIS-Basis-DLM-Datensatz aus Wohnbauflächen, Industrie- und Gewerbeflächen, Flächen gemischter Nutzung sowie Flächen besonderer funktionaler Prägung zusammen.

# Lufttemperatur



**Tab. 1:** In der Tabelle ist die Differenz zwischen den 30-jährigen Mitteln zwischen 1991 bis 2020 und 1881 bis 1910 angegeben.


Zeitraum	Änderung [°C]
Frühjahr	+1.6
Sommer	+1.3
Herbst	+1.2
Winter	+1.6
Kalenderjahr	+1.4

## Das Klima gestern und heute

In der Niederrheinischen Bucht wird aktuell (Daten der Klimanormalperiode 1991 - 2020) mit 10,9 Grad Celsius zusammen mit dem Niederrheinischen Tiefland die höchste Jahresdurchschnittstemperatur in NRW erreicht (NRW-Schnitt: 10,0 °C). Damit ist die Lufttemperatur in 110 Jahren (Vergleich zur Klimanormalperiode 1881 - 1910) um 1,4 Grad Celsius angestiegen. Der Anstieg der Temperatur lässt sich in allen Jahreszeiten beobachten. Besonders stark haben sich Frühjahr und Winter erwärmt, den geringsten Anstieg der Temperatur zeigt der Herbst. Die zehn wärmsten Jahre im Messzeitraum sind alle nach 1994 aufgetreten.

## Das Klima morgen

Der Temperaturanstieg wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Auch mit ambitionierten Klimaschutzmaßnahmen (RCP 2.6<sup>1)</sup> steigt die Jahresmitteltemperatur um weitere 0,8 bis 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum Referenzzeitraum 1971 - 2000 (10,2 Grad Celsius), bevor sie sich auf diesem Niveau stabilisiert. Ohne weitere Klimaschutzmaßnahmen (RCP 8.5) steigt die Temperatur bis zum Ende des Jahrhunderts um 2,8 bis 4,4 Grad Celsius. Die bisher erlebten Extremjahre wie 2014, 2018 und 2020 werden zukünftig zur Normalität – auch bei weltweiten ambitionierten Klimaschutzmaßnahmen.




**Tab. 2:** In der Tabelle sind die Differenzen zwischen den 30-jährigen Mitteln von 2071 bis 2100 und 1971 bis 2000 gerundet auf 0.1 Grad Celsius angegeben.

Klimaszenario	Zeitraum	Änderung [°C]
RCP2.6	Frühjahr	+0.5 bis +1.1
RCP2.6	Sommer	+0.9 bis +1.6
RCP2.6	Herbst	+0.6 bis +1.9
RCP2.6	Winter	+0.9 bis +1.4
<b>RCP2.6</b>	<b>Jahr</b>	<b>+0.8 bis +1.5</b>
RCP8.5	Frühjahr	+2.1 bis +3.1
RCP8.5	Sommer	+3 bis +4.8
RCP8.5	Herbst	+3.1 bis +5.5
RCP8.5	Winter	+2.9 bis +4.2
<b>RCP8.5</b>	<b>Jahr</b>	<b>+2.8 bis +4.4</b>

<sup>1</sup> Die in diesem Factsheet verwendeten Abkürzungen RCP 2.6 („Klimaschutz“) und RCP 8.5 („weiter-wie-bisher“) stehen für die repräsentativen Pfade der möglichen Konzentration an Treibhausgasen (Moss et al. 2010). Damit werden Szenarien der globalen, menschlichen Entwicklung abgebildet. Die Zahlen stehen für den geänderten Strahlungsantrieb gegenüber jenem von 1850 - 1900 (z. B. RCP 8.5 = 8,5 Watt pro Quadratmeter). Die Datengrundlage für die Projektionen beruhen auf Brienen et al. (2020).

# Niederschlag



**Tab. 3:** Angegeben sind die prozentualen Veränderungen in den unterschiedlichen Jahreszeiten der 30-jährigen Mittel zwischen 1991 bis 2020 und 1881 bis 1910.


Zeitraum	Änderung [%]
Frühjahr	+ 6.2
Sommer	- 2.2
Herbst	+ 6
Winter	+ 25.4
Kalenderjahr	+ 6.8

## Das Klima gestern und heute

Die mittlere jährliche Niederschlagssumme liegt aktuell (KNP 1991 - 2020) mit 726 Millimeter unter dem Schnitt für NRW von 870 Millimeter. Im Vergleich zur KNP 1881 - 1910 bedeutet dies einen Anstieg der Niederschlagssumme um rund 6,8 Prozent (46 Millimeter), analog zum steigenden DAS-Trend<sup>2</sup> für die Jahresniederschlagssumme. In den einzelnen Jahreszeiten ist die Entwicklung der Niederschlagsmengen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Besonders stark hat die Niederschlagsmenge im Winter zugenommen, im Sommer dagegen nahm die mittlere Niederschlagssumme leicht ab.

## Das Klima morgen

Für den Jahresniederschlag ist in der Zukunft keine eindeutige Entwicklung erkennbar. Hier schwankt die weitere Entwicklung in beiden Szenarien um circa  $\pm 10$  bis  $\pm 20$  Prozent. Für die Niederschläge zeigt sich für das Szenario „weiter-wie-bisher“ eine Abnahme der Niederschläge im Sommer und eine weitere Zunahme der Niederschläge in Winter und Frühjahr. Für das Szenario „Klimaschutz“ ist die Entwicklung nicht eindeutig. Die Niederschläge können sowohl im Winter als auch im Sommerhalbjahr zu- oder abnehmen.




**Tab. 4:** In der Tabelle sind die prozentualen Veränderungen der 30-jährigen Mittel zwischen 2071 bis 2100 und 1971 bis 2000 gerundet auf 1 Prozent angegeben.

Klimaszenario	Zeitraum	Änderung [%]
RCP2.6	Frühjahr	- 2 bis + 15
RCP2.6	Sommer	- 10 bis + 9
RCP2.6	Herbst	- 9 bis + 6
RCP2.6	Winter	- 5 bis + 17
<b>RCP2.6</b>	<b>Jahr</b>	<b>- 5 bis + 6</b>
RCP8.5	Frühjahr	+ 1 bis + 22
RCP8.5	Sommer	- 21 bis - 1
RCP8.5	Herbst	- 11 bis + 12
RCP8.5	Winter	+ 7 bis + 32
<b>RCP8.5</b>	<b>Jahr</b>	<b>- 3 bis + 12</b>

<sup>2]</sup> Die hier verwendeten DAS (Deutsche Anpassungsstrategie) -Trends beschreiben regressionsbasierte Trendmuster unter Berücksichtigung statistischer Test- und Schätzverfahren (beobachteter Zeitraum: 1881 bis 2020). DAS-Trends für Jahresmitteltemperatur und Jahresniederschlag wurden 2019 im Monitoringbericht zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel des Umweltbundesamtes veröffentlicht.

# Kenntage



**Tab. 5:** Angegeben sind die Differenzen zwischen den 30-jährigen Mitteln zwischen 1991 bis 2020 und 1951 bis 1980.

Kenntage	1951-1980	1991-2020	Änderung [Tage]
Eistage	10	6	- 4
Frosttage	59	48	- 11
Sommertage	29	44	+ 15
Heiße Tage	4	10	+ 6


Kenntage	Kriterium
Eistage	Tageshöchsttemperatur < 0°C
Frosttage	Tagestiefsttemperatur < 0°C
Sommertage	Tageshöchsttemperatur ≥ 25°C
Heiße Tage	Tageshöchsttemperatur ≥ 30°C
Schneedeckentage	Tage mit geschlossener Schneedecke ≥ 1 cm

## Das Klima gestern und heute

Gemäß der stärkeren Temperaturzunahme haben die kältebedingten Kenntage ab- und die wärmebedingten Kenntage zugenommen. Aktuell (KNP 1991 - 2020) treten in der Niederrheinischen Bucht im Mittel sechs Eistage, 48 Frosttage, 44 Sommertage und zehn Heiße Tage pro Jahr auf. Bei den Niederschlagskenntagen war, ähnlich der Jahresniederschlagssumme, ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Zurzeit kommen hier pro Jahr durchschnittlich 19 Tage mit einem Tagesniederschlag über 10 Millimeter und vier Tage mit einem Tagesniederschlag über 20 Millimeter vor.

## Das Klima morgen

Aufgrund des fortdauernden Temperaturanstiegs werden die kältebezogenen Kenntage weiter abnehmen und die wärmebezogenen Kenntage weiter zunehmen. Im Szenario „weiter-wie-bisher“ könnte die Anzahl der Frosttage um weitere 30 bis 43 Tage pro Jahr im Vergleich zum Zeitraum 1971 - 2000 (52 Tage) auf im Mittel dann noch circa neun bis 22 Frosttage pro Jahr abnehmen. Die Anzahl der Sommertage könnte dagegen um weitere 29 bis 56 Tage pro Jahr zunehmen (1971 - 2000: 35 Tage). Bei starken Klimaschutzmaßnahmen fällt die Ab- und Zunahme geringer aus.



**Abb. 7:** Temperaturkenntage morgen in der Niederrheinischen Bucht

**Tab. 6:** In der Tabelle sind die Differenzen zwischen den 30-jährigen Mitteln von 2071 bis 2100 und 1971 bis 2000 angegeben.

Klimaszenario	Kenntage	Änderung [d]
RCP2.6	Eistage	- 5 bis - 3
RCP2.6	Frosttage	- 18 bis - 9
RCP2.6	Sommertage	+ 7 bis + 15
RCP2.6	Heiße Tage	+ 3 bis + 9
RCP8.5	Eistage	- 9 bis - 6
RCP8.5	Frosttage	- 43 bis - 30
RCP8.5	Sommertage	+ 29 bis + 56
RCP8.5	Heiße Tage	+ 14 bis + 30

# Ausgewählte Auswirkungen des Klimawandels



## Handlungsfeld Wasserwirtschaft und Hochwasserschutz

**Starkregenereignisse:** Jüngste Erkenntnisse belegen eine signifikante Zunahme von Starkniederschlagsereignissen (LANUV NRW 2021); diese könnten zukünftig noch häufiger und intensiver vorkommen (IPCC 2021).

**Verdunstung:** Durch die steigenden Temperaturen findet mehr Verdunstung statt, was die klimatische Wasserbilanz negativ beeinflusst. Diese lag für das Jahr 2018 in NRW erstmals seit Messbeginn im negativen Bereich. Besonders im Frühling ist bei der klimatischen Wasserbilanz eine signifikante Abnahme zu beobachten.

**Verschlechterung des ökologischen Gewässerzustandes:** Durch Sauerstoffknappheit in wärmeren Gewässern und häufigeres Niedrigwasser im Sommer können sich die Lebensbedingungen im Wasser verschlechtern. Beispielsweise die Gewässertemperatur im Rhein steigt nachweislich immer weiter an. Vor allem Sauerstoffarmut in Folge von Algenblüten und geringerer Sauerstofflöslichkeit aufgrund höherer Temperaturen spielen hier eine Rolle. Auch erhöhen sich die Schadstoffkonzentrationen, weil weniger Wasser zur Verdünnung von Einleitungen zur Verfügung steht.



## Handlungsfeld Landwirtschaft

**Beeinträchtigung des Pflanzenwachstums und Ertrags:** Durch die steigenden Durchschnittstemperaturen in Verbindung mit einer saisonalen Verschiebung der Niederschläge kann es zu Trockenstress bei Pflanzen und damit zu Ertragsverlusten kommen. Insbesondere in den niederschlagsarmen Regionen – wie der Zülpicher Börde – können sich heiße, trockene Sommer wie 2018 negativ auswirken.

**Phänologie von Kulturpflanzen:** Phänologische Ereignisse wie die Apfelblüte oder die Aussaat und das Auflaufen wichtiger landwirtschaftlicher Kulturen verfrühen sich. Dadurch vergrößert sich das Risiko von Ertragsausfällen durch Spätfröste.



## Handlungsfeld Menschliche Gesundheit

**Thermische Belastung:** Hitzebelastung tritt insbesondere in den Ballungsgebieten auf. Bereits heute sind laut Klimanalyse NRW an einem typischen Sommertag in Köln über 60 Prozent der Bevölkerung von Hitze betroffen, in Bonn über 50 Prozent. Insbesondere in städtischen Lagen treten vermehrt Tropennächte und Hitzetage auf. Die erhöhte Sterberate infolge außergewöhnlicher Hitzewellen zeigt, dass in Zukunft bei einer Häufung extremer Wetterlagen mit weitreichenden Konsequenzen für die menschliche Gesundheit gerechnet werden muss.



## Handlungsfeld Stadtentwicklung und kommunale Planung

**Städtische Hitzeinseln:** Durch den anthropogenen Klimawandel erhöht sich die allgemeine Wärmebelastung. Die Menschen leiden jedoch vor allem in den Städten, wo der Effekt der städtischen Wärmeinsel die Temperaturen zusätzlich beeinflusst. Die Erreichbarkeit und die Vernetzung von öffentlichen Grünflächen sind daher von zentraler Bedeutung, um die Wärmebelastung zu vermindern und die Kühlung als städtebauliches Ziel voranzutreiben. Sie dienen nicht nur als Erholungsflächen, sondern wirken auch der Bildung von Hitzeinseln in dicht besiedelten Bereichen entgegen. In hochverdichteten Städten unterstützen private Grünflächen diese positiven Auswirkungen genauso wie die immer häufiger realisierten Dach- oder Fassadenbegrünungen.

**Starkregenereignisse:** Jährlich ist rund ein Siebtel der Siedlungsgebiete in NRW von einem unweatherartigen Starkregenereignis betroffen. Diese können jedoch von neuen unversiegelten Flächen als zusätzliche Speicherräume für Niederschlagswasser besser kompensiert werden. Das Schwammstadtkonzept sollte flächendeckend bei der Stadtplanung angewendet werden.

# Zum Weiterlesen: Fachinformationssysteme des LANUV



## **Klimaatlas NRW**

Im Klimaatlas NRW werden Grundlageninformationen zur klimatischen Entwicklung flächenhaft als Karten für Nordrhein-Westfalen bereitgestellt. Dabei werden die Lufttemperatur, die Niederschlagssumme sowie die Sonnenstrahlung durch verschiedene Parameter abgebildet. Die Daten umfassen verschiedene 30-jährige Zeiträume sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft. » [www.klimaatlas.nrw.de](http://www.klimaatlas.nrw.de)



## **FIS Klimaanpassung NRW**

Das Fachinformationssystem Klimaanpassung NRW stellt exemplarisch mögliche Auswirkungen der zukünftigen Klimaentwicklung dar und liefert so Planungsgrundlagen für Anpassungsmaßnahmen. Zurzeit sind mögliche Klimafolgen für zwölf Handlungsfelder im FIS Klimaanpassung enthalten. Den aktuellsten Inhalt stellt die Starkregenhinweiskarte für NRW dar, die landesweite Informationen über durch Starkregen gefährdete Kommunen oder besondere Gefahrenbereiche innerhalb der Kommunen liefern kann. » [www.klimaanpassung.nrw.de](http://www.klimaanpassung.nrw.de)



## **Klimafolgenmonitoring NRW**

Das Klimafolgenmonitoring zeigt die Auswirkungen des bereits beobachteten Klimawandels auf verschiedene Handlungsfelder und Umweltbereiche in Nordrhein-Westfalen auf. Mit der Aktualisierung 2021 wird die Anwendung um das Thema Anpassung erweitert und über 80 Indikatoren in 16 Umweltbereichen dargestellt. » [www.klimafolgenmonitoring.nrw.de](http://www.klimafolgenmonitoring.nrw.de)

Die drei Systeme sollen im Jahr 2022 in einem gemeinsamen System zusammengeführt werden.

### **Datengrundlage:**

**DWD/CDC** – Deutscher Wetterdienst/Climate Data Center (Hrsg.) (2021): Grids Germany - Annual. [ftp://ftp-cdc.dwd.de/pub/CDC/grids\\_germany/annual/](ftp://ftp-cdc.dwd.de/pub/CDC/grids_germany/annual/)  
**BMV** – Brienen, S.; Walter, A.; Brendel, C.; Fleischer, C.; Ganske, A.; Haller, M.; Helms, M.; Höpp, S.; Jensen, C.; Jochumsen, K.; Möller, J.; Krähenmann, S.; Nilson, E.; Rauthe, M.; Razafimaharo, C.; Rudolph, E.; Rybka, H.; Schade, N. & Stanley, K. (2020): Klimawandelbedingte Änderungen in Atmosphäre und Hydrosphäre: Schlussbericht des Schwerpunktthemas Szenarienbildung (SP-101) im Themenfeld 1 des BMVI-Expertennetzwerks. 157 Seiten. DOI: 10.5675/ExpNBS2020.2020.02  
**LANUV NRW** – LANUV NRW (Hg.), Quirnbach, Markus et al. (2021). ExUS 2020 – Ganzheitliche Analyse der Niederschlagsentwicklung in Nordrhein-Westfalen – Fortschreibung und Erweiterung der Studie ExUS 2010. Recklinghausen: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen.

### **Kartengrundlage:**

Land NRW (2021) Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

### **Literatur:**

**RCP** – Moss, R., Edmonds, J., Hibbard, K., Manning, M., Rose, S., van Vuuren, D., Carter, T., Emori, S., Kainuma, M., Kram, T., Meehl, G., Mitchell, J., Nakicenovic, N., Riahi, K., Smith, S., Stouffer, R., Thomson, A., Weyant, J. & Wilbanks, T. (2010): The next generation of scenarios for climate change research and assessment. *Nature* 463, 747–756. DOI: <https://doi.org/10.1038/nature08823>  
**IPCC** – Intergovernmental Panel on Climate Change (Hrsg.) (2021): Summary for Policymakers. In: *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.  
**DAS** – Monitoringbericht 2019 zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel: Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe Anpassungsstrategie der Bundesregierung. Umweltbundesamt, 2019. Online verfügbar unter <https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltbundesamt-2019-monitoringbericht-2019-zur/>  
**Land NRW (2021)** – ATKIS Basis-DLM. Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0  
**LANUV (2021)** – Klimabericht NRW 2021, Klimawandel und seine Folgen – Ergebnisse aus dem Klimafolgen- und Anpassungsmonitoring. LANUV-Fachbericht 120. Recklinghausen. Online verfügbar unter [www.lanuv.nrw.de/landesamt/veroeffentlichungen/publikationen/fachberichte/](http://www.lanuv.nrw.de/landesamt/veroeffentlichungen/publikationen/fachberichte/)

### **Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV)**

Leibnizstraße 10 · 45659 Recklinghausen · Telefon 02361 305-0 · poststelle@lanuv.nrw.de · www.lanuv.nrw.de  
Bildnachweis: adobestock.com · shokokoart / hanseat

Stand: November 2021